


EVELYNE FUSILIER



*Les
Oiseaux
de
La Roche Canillac*



 [Clic](#)

SOMMAIRE

	Page
En guise d'introduction	3
Remerciements	3
Manuel du parfait ornithologue	4
Associations locales	4
Bibliographie sommaire	5
Comment identifier un oiseau	6
Topographie de l'oiseau : lexique de base	7
Fiche type	8
Les oiseaux de La Roche Canillac.....	9
Index des noms français	72
Promenades ornithologiques	73
Plan de La Roche Canillac	77

Version imprimée (1992) disponible chez l'auteur :

Evelyne Fusilier

Lavergne

19320 La Roche Canillac


evelyne.fusilier@wanadoo.fr - 05 55 29 10 22

Prix : 5 € + Frais d'envoi : 3,50 €.

Version informatique gratuite (2007, discrètes révisions)
optimisée pour MSWord 97.

Naviguez dans le document grâce aux liens hypertextes.

Pour rechercher un oiseau, vous pouvez utiliser l'[index des noms français](#) ou effectuer une recherche sur tout le texte (raccourci clavier **CTRL + F**).



Edition, maquette, composition et copyright :

© E. FUSILIER, Lavergne - 19320 LA ROCHE CANILLAC.

Dessins à la plume : E. FUSILIER, d'après P. BARRUEL, D. CLAVREUL, T. HAYWARD, H. HEINZEL, K. HISEK, R. PETERSON, L.-P. ROBERT, A. SINGER.

Dépôt légal : Avril 1992

ISBN : 2-9506607-0-3

Version informatique : Septembre 2007

EN GUISE D'INTRODUCTION ↑

Plutôt qu'un guide d'identification, ce modeste ouvrage est un inventaire des oiseaux observés sur le territoire de la commune de La Roche Canillac. Les illustrations et les fiches descriptives vous aideront à les reconnaître dans la nature. Les espèces présentées sont presque toutes communes.

Fenêtre ouverte sur la nature, cet ouvrage s'adresse à tous, petits et grands, initiés et néophytes, Les quatre [promenades](#) proposées aux pages 73 et suivantes sont autant d'invitations à la découverte. La vie sauvage à La Roche Canillac est riche d'au moins 63 espèces d'oiseaux, de centaines d'espèces de plantes, de milliers d'espèces d'insectes et autres petites bêtes, sans oublier les mammifères et les poissons. Un véritable trésor, à la portée de tous les regards, mais un trésor fragile qu'il faut protéger (Voir le site de la [communauté de communes du Doustre et du plateau des étangs](#) dont fait partie La Roche Canillac). L'auteur invite ses lecteurs à lui signaler les erreurs ou fautes de frappe et à lui faire part de leurs commentaires.

REMERCIEMENTS ↑

A Ian Jenkinson, mon mari, pour ne m'avoir pas permis de laisser dormir ce projet dans un tiroir et pour son soutien au jour le jour. A Marion, ma fille, pour ses contributions à l'inventaire.

A tous les éminents ornithologues dont j'ai consulté les publications. Aux merveilleux artistes animaliers dont les illustrations en couleurs ont servi de modèles à mes dessins à la plume. A Guy Labidoire, de la SEPOL, pour ses encouragements et ses conseils.

A Jacques Bourdarias pour les Noms occitans des oiseaux et les anecdotes se rapportant à la tradition limousine.

A Yannik Séguin, grand chasseur de coquilles et maladresses de toutes plumes, pour la relecture des épreuves.

Aux bibliothécaires de Tulle pour leur disponibilité.

Aux héros de l'histoire : LES OISEAUX DE LA ROCHE CANILLAC.

MANUEL DU PARFAIT ORNITHOLOGUE ↑

Pour réussir dans ce dur métier, il vous faudra :

- un guide d'identification (Voir page 4) ;
- une paire de jumelles ;
- un carnet et un crayon ;
- des vêtements et des chaussures confortables ;
- de la patience.



Un peu de rigueur et de prudence aussi, avant de vous prononcer définitivement sur le nom d'une espèce.

Et, tout à fait entre nous, soyez discret, surtout à la saison des nids : certains oiseaux abandonnent leur nid et leur couvée s'ils sont dérangés. Et tous s'envolent à l'approche d'une troupe agitée et bruyante : une méthode infailible pour résoudre l'épineux problème de l'identification !

Enfin, dès les premiers symptômes de l'ornithologite aiguë, n'hésitez pas à prendre contact avec une association ornithologique (Voir ci-dessous). Ses animateurs se chargeront, à l'occasion de quelques sorties, de vous inoculer une dose radicale de cette maladie incurable.

ASSOCIATIONS ORNITHOLOGIQUES ↑

- [SEPOL](#) : Société d'Etude et de Protection des Oiseaux du Limousin - 11 rue Jauvion - 87000 Limoges.
- COA : Centre Ornithologique Auvergne 3 rue du Maréchal Joffre - 63000 Clermont-Ferrand.
- [LPQ](#) : Ligue pour la Protection des Oiseaux (au niveau national) La Corderie Royale, BP 263 - 17305 Rochefort Cedex.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE [↑](#)

GUIDES

- PETERSON. MOUNTFORT, HOLLUM & GEROUDET : Guide des oiseaux d'Europe, Ed. Delachaux & Niestlé 1986.
- HEINZEL, FITTER & PARSLAW : Oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Ed. Delachaux & Niestlé 1972.
- BRUUN & SINGER : Tous les oiseaux d'Europe, Ed. Bordas 1990.
- SVENSSON, MULLARNEY, ZETTERSTRÖM, GRANT : Le guide Ornitho, Ed. Delachaux & Niestlé, 2000

GENERALITES

- J. DORST - La vie des oiseaux, tomes 1 et 2 - Ed. Bordas 1971.
- P. GEROUDET - Ed. Delachaux & Niestlé :
 - Les Echassiers, 1967.
 - Grands Echassiers, 1978.
 - Limicoles, Gangas et Pigeons d'Europe, t. 1 (1982) et 2 (1983).
 - Les Palmipèdes, 1982.
 - Les Passereaux, tomes 1 (1980), 2 (1984) et 3 (1980).
 - Les Rapaces diurnes et nocturnes d'Europe, 1984.
- J-F. DEJONGHE - Les oiseaux du jardin, Compagnie Internationale du Livre 1985.
- J-F. DEJONGHE - Les oiseaux des villes et des villages, Ed. Le Point Vétérinaire 1983.
- ALEXANDRE & LESAFFRE - Regardez vivre les oiseaux (tome 1), Ed. Delachaux à Niestlé 1988.

REVUES LOCALES

- EPOPS, l'ornithologie en Limousin - SEPOL (Voir page 4).
- LE GRAND DUC - COA (Voir page 4).

COMMENT IDENTIFIER UN OISEAU ↑


Par ordre de difficulté croissante d'appréciation, les éléments à noter sont :

- l'époque et le milieu (Ex : au [mois de](#) janvier, par -15 °C, sur le rebord de votre fenêtre).
- la Taille : comparez avec une espèce connue, Moineau, Merle, Pigeon, Corneille (Ex : comme un Moineau, donc un petit oiseau).
- la forme générale (le même exemple : plutôt rond).
- les couleurs (Ex : le dos olive et la poitrine orange).
- les proportions (Ex : une grosse tête et de grands yeux).
- l'attitude (Ex : dressé, la queue relevée et les ailes vers le bas).
- le chant, les cris d'appel ou d'alarme et autres manifestations sonores (Ex : Chant mélancolique, coups de becs impérieux sur les vitres).



Récapitulons : par un matin glacial de janvier, un petit oiseau rond, le dos olive et la poitrine orange, avec une grosse tête et de grands yeux, se tient dressé sur le rebord de votre fenêtre, la queue relevée, les ailes vers le bas, et martèle vos carreaux à coups de bec répétés : un Rouge-gorge ! Bravo ! Et celui-ci qui vient de passer comme une fusée et qui gesticule en silence et à contre-jour en haut des grands épicéas, dans la pénombre et sous la pluie ? Vous ne voyez pas ce que c'est ? Et cet autre énergumène que vous essayez d'approcher depuis vingt minutes et qui, au moment crucial où vous allez enfin l'apercevoir, cesse de chanter... pour recommencer un peu plus loin et derrière vous ! "Ah, qu'ils sont donc agaçants à remuer comme ça tout le temps !" Bon, je vois que vous êtes dans le bain : bon courage !

TOPOGRAPHIE DE L'OISEAU : LEXIQUE DE BASE ↑



Le nom des *plumes* est indiqué en italique. Des termes non officiels, mais évocateurs, émaillent également les descriptions (bavette, plastron). L'imagination du lecteur est mise à contribution.


FICHE TYPE ↑

Nom usuel - Nom scientifique
Autre nom usuel - Statut de protection

Ordre
Famille

Nom local : nom(s) en occitan. Plusieurs espèces peuvent porter le même nom. Certaines n'ont pas de nom occitan.
GB : Anglais - D : Allemand - NL : Néerlandais - I : Italien - E : Espagnol - DK : Danois.

♂ : mâle
♀ : femelle



Envergure

Taille : Longueur tête-queue - E : Envergure (donnée lorsque significative pour l'identification).

Description : Couleurs. Différentiation mâle-femelle.

Sédentaire : Les mêmes individus restent toute l'année.
Migrateur partiel : Espèce présente toute l'année, mais certains individus migrent pour l'hiver et d'autres viennent de régions ou pays plus froids pour hiverner en Limousin.
Migrateur : Espèce passant l'hiver dans les pays chauds.

Habitat : Types de paysages fréquentés par cette espèce.

Nourriture : Type de Nourriture (graines, insectes..).
Mode de collecte (à terre, en vol...).

Particularités : Attitudes et comportement typiques de l'espèce (queue relevée du Troglodyte..). Autres "curiosités" (chant..). Éventuellement, tradition limousine concernant cette espèce.

A La Roche : Anecdotes locales et lieu où l'espèce a été vue ou entendue sur le territoire de la commune.

1 **Héron cendré** - *Ardea cinerea*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Ciconiiformes
Ardeidés

GB : Grey Heron - D : Fischreiher - NL : Blaauwe reiger - I : Airone cenerino - E : Gara real - DK : Fiskehejre - S : Grå häger.



Taille : 90 cm - E : 185 cm.

Description : Très grand oiseau gris, blanc et noir. Dessus gris, bout des ailes noir Tête et long cou blancs. Raie noire de l'œil à la pointe de la longue hupe. Long bec en poignard et longues pattes.

Migrateur partiel : observable toute l'année.

Habitat : Près de l'eau, y compris le bord de mer.

Nourriture : Poissons, grenouilles, petits mammifères, petits oiseaux, serpents, mollusques, insectes. Poignarde ses proies avec son long bec pointu après un long affût.

Particularités : Vol lent et lourd, le cou plié et les pattes tendues en arrière. Ailes arrondies, Nichent en colonies en haut de grands arbres.

A La Roche : Nous avons un habitué au bord d'un petit étang privé à Lavergne. On le voit aussi survoler le ruisseau des Vergnes ou le Doustre vers le Moulin de Larchat.


2 **Canard colvert** - *Anas platyrhynchos*
(Canard sauvage)

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Ansériformes
Anatidés

Nom local : Cana (cane), Canart (canard) sauvatge : Canetou.

GB : Mallard - D : Stockante - NL : Wilde eend - I : Germano reale - E : Anade real - DK : Gråand - S : Gräsand.



Taille : 55 cm.

Description : **Mâle : tête vert foncé**, fin collier blanc, poitrine marron, bec jaune, dos et dessous gris, plumes en boucle à la base de la queue. Femelle : brun tacheté, bec gris et orange. Les deux : **miroir bleu-violet entre deux barres blanches**. Entre juin et août les mâles ressemblent aux femelles.

Migrateur partiel : observable toute l'année.

Habitat : Eaux calmes.

Nourriture : Surtout des plantes aquatiques et terrestres : petits animaux aquatiques. Bascule comiquement l'avant du corps dans l'eau pour se nourrir.

Particularités : Vol à battements rapides. Ancêtre du canard domestique. C'est la cane qui émet le célèbre "coin-coin".

A La Roche : Un couple semi-domestique niche à Lavergne.

3 Milan noir - *Milvus migrans*

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Falconiformes
Accipitridés

Protégé

Nom local : Ausel de las polas. Tous les rapaces sauf l'épervier s'appellent "oiseaux des poules".

GB : Black Kite - D : Schwarzer Milan - NL : Zwarte vouw - I : Nibbio bruno - E : Milano negro - DK : Sort Glente - S : Brun glada.



Taille : 55 cm. E : 120 cm.

Description : Plumage brun foncé, bande plus claire sur l'aile. Queue longue et peu fourchue, droite en vol (triangle). Pattes jaunes. Dessous brun roux. Ailes étroites, en comparaison avec la [buse](#).

Migrateur : présent de mars à septembre. Migre vers l'Afrique tropicale.

Habitat : Voisinage de l'eau (lacs, fleuves, mer). Bois près de l'eau.

Nourriture : Poissons, souvent morts ou malades : petits vertébrés vivants ou morts (Ex : sur les routes). Chasse le jour.

Particularités : Pivote la queue en vol. Chasse souvent au-dessus de l'eau. Fréquente les dépôts d'ordures. Assez souvent en groupe.

A La Roche : A Lavergne et au-dessus du bourg.

4 **Milan royal** - *Milvus milvus*


Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Falconiformes
Accipitridés

Nom local : Ausel de las polas (Voir : [Milan noir](#)).

GB : Red Kite - D : Roter Milan - NL : Rode wouw - I : Nibbio reale - E : Milano real - DK : Rød Glente - S : Vanlig glada.



Taille : 61 cm. E : 145 à 155 cm

Description : Tête claire. Dessus brun roux montrant une large bande claire en vol. **Dessous roux avec deux grandes taches blanches** sous les rémiges primaires. **Queue longue, rousse et très fourchue**, même en vol (Voir : Milan noir). Ailes plus longues et plus étroites que celles du [Milan noir](#).

Migrateur partiel.

Habitat : Régions boisées et cultivées, de préférence avec un certain relief.

Nourriture : Invertébrés et petits vertébrés, Le trafic automobile lui procure une bonne part de sa pitance, avantage qu'il paie souvent de sa vie en subissant le même sort que ses proies.

Particularités : Aime bien squatter les nids d'autres rapaces, de Hérons et de Corneilles, Vol très léger, la queue pivotante presque toujours en mouvement.

A La Roche : Au-dessus du Bourg.


5 **Buse variable** - *Buteo buteo*
Protégée

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Falconiformes
Accipitridés

Nom local : Ausel de las polas (Voir : [Milan noir](#)).

GB : Buzzard - D : Mäusebussard - NL : Buizerd - I : Poiana - E : Ratonero común - DK : Musvåge - S : Ormråk.



Taille : 50 - 55 cm, E : 120 - 135 cm.

Description : Plumage variable. **Grand oiseau massif.**
Ailes larges. Cou bref. Large queue arrondie, assez courte. Zone claire sous les ailes. Queue striée de nombreuses barres sombres étroites. **Pattes jaunes.**

Sédentaire

Habitat : Régions boisées et cultivées.

Nourriture : Petits mammifères, surtout des campagnols, grenouilles, insectes. Le rapt de poules est peu fréquent et souvent le fait de l'Autour des palombes ! Guette sa proie à l'affût, en vol circulaire, voire en marchant.

Particularités : Présente tout l'hiver, Vol lourd, excellent planeur prenant plaisir à profiter des « ascendantes » par temps chaud. Vole parfois sur place.

A La Roche : Fréquente assidûment Lavergne, Laborde, La Roche Haussière, la route de Saint Martin. Par une chaude journée de printemps, j'en ai vu jusqu'à 14 planer ensemble au-dessus de Lavergne.


6 **Pigeon ramier** - *Columba palumbus*
(Palombe)

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Columbiformes
Columbidés

Nom local : Paloma ou Palomba

GB : Wood Pigeon - D : Ringeltaube - NL : Houtduif - I : Colombaccio - E : Paloma torcaz - DK : Ringdue - S : Ringduva.



Taille : 40 cm

Description : Gros pigeon gris-bleu. Poitrine rose foncé. De chaque côté du cou, taches blanches entourées de reflets verts et pourpres. Croissants blancs sur le dessus des ailes, bien visibles en vol. Bande noire au bout de la queue.

Migrateur : Hiverné dans les pays méditerranéens.

Habitat : Là où il y a des arbres, jusque dans les villes.

Nourriture : Graines, fruits, verdure. Se nourrit à terre et dans les arbres. Poussins nourris de "lait de pigeon", une pâte produite dans le jabot des parents.

Particularités : Vol rapide et direct, Migre en grands groupes. Sociable, se mêle volontiers aux pigeons domestiques et colompins.


A La Roche : Vus en vol au-dessus de Lavergne.

7 **Tourterelle turque** - *Streptopelia decaocta*
Columbidés

Columbiformes

Nom local : Tortorela blanchea.

GB : Collared Dove - D : Türkentaube - NL : Turkse tortel - I : Tortora turca - E : Tórtola turca - DK : Tyrkerdue - S : Turkduva.



Taille : 27 cm.

Description : Plus petite et plus fine qu'un pigeon.
Beige. Pointe des ailes brun foncé. Demi-collier noir à la nuque chez l'adulte. Longue queue, au dessous noir à la base et blanc à la moitié terminale.

Sédentaire

Habitat : Villes et villages, parcs, jardins.

Nourriture : Graines, baies, Mollusques en petite quantité.

Particularités : Apparue en Limousin à la fin des années 60 et très commune aujourd'hui. Rassemblement en dortoir la nuit, en automne et en hiver.

A La Roche : un gracieux habitant du bourg, où elle fait entendre ses roucoulements en trois notes (la seconde plus longue et plus accentuée). On la voit aussi aux Quatre-Routes. Compense un médiocre talent pour la composition le nombre de ses interprétations.

8 Tourterelle des bois - *Streptopelia turtur*

[↑ Sommaire](#)


[↓ Index](#)

Columbiformes

Columbidés

Nom local : Tortorela grisa

GB : Turtle Dove - D : Turteltaube - NL : Tortelduif - I : Tortora - E : Tórtora común - DK : Turteldue - S : Turturduva.



Taille : 27 cm.

Description : Plus petite que les Pigeons. Tête et nuque grises. Dessus écaillé, roux tacheté de noir. Zone striée noir et blanc de chaque côté du cou (adulte). Poitrine et pattes rose vineux (Jeunes : grises). Queue étagée noirâtre, bordée de blanc. Zone rosée autour de l'œil.

Migratrice : Présente de mai à septembre. Migre vers l'Afrique tropicale.

Habitat : Campagne cultivée avec bosquets : bois clairs : parcs, vergers.

Nourriture : Graines, pousses : invertébrés en petite quantité.

Particularités : Vol rapide, direct et saccadé. Sociable. Très sensible aux dérangements au nid. On élevait autrefois, dans presque toutes les fermes, des Tourterelles en cages, ainsi que des Geais et des Chardonnerets.

A La Roche : Entendue a la lisière des bois à Lavergne.


9 **Coucou gris** - *Cuculus canorus*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Cuculiformes
Cuculidés

Nom local : Coucut.

GB : Cuckoo - D : Kuckuck - NL : Koekoek - I : Cuculo - E : Cuco - DK : Gøg - S : Gök.



Taille : 33 cm.

Description : Dessus, tête, gorge et haut de la poitrine gris ardoise. Dessous blanc barré de gris. Longue queue grise étagée, ponctuée de blanc. Ailes pointues. Certaines femelles sont rousses et barrées dessus et dessous.

Migrateur : Présent de fin mars à septembre. Migre vers l'Afrique tropicale et australe.

Habitat : Tous les milieux, pas trop près des zones habitées.

Nourriture : Insectes et larves. Chenilles velues.

Particularités : Difficile à voir posé. Solitaire. Vole la tête haute (contrairement aux Faucons, avec lesquels il peut être confondu) et les ailes vers le bas. Le Coucou ne fait pas de nid et utilise une méthode d'élevage des poussins efficace, de son point de vue - quoique discutable du nôtre : la femelle pond dans un nid de petits passereaux. Chaque femelle parasite toujours la même espèce et ses œufs imitent ceux de l'hôte. A peine éclos, le poussin vide le nid des œufs ou des oisillons qui s'y trouvent : ses parents adoptifs n'auront ainsi que lui à nourrir... et c'est une énorme tâche !

A La Roche : On l'entend dans tous les bois, surtout autour de l'étang de Laborde.


10 **Chouette effraie** - *Tyto alba*
(Dame blanche) - Protégée

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Strigiformes
Tytonidés

Nom local : Dama blancha

GB : Barn Owl - AD : Schleiereule - NL : Kerkuil - I : Barbagianni - E : Lechuza común - DK : Slørugle - S : Tornuggla.



Taille : 35 cm. E : 95 cm.

Description : **Pâle**. Visage blanc en forme de cœur. Dessus roux doré aux pluies marbrées de gris et de points blancs et noirs. Dessous blanc, parfois roux clair. **Dessous des ailes blanc**, bien visible en vol.

Sédentaire : se déplace en période d'enneigement.

Habitat : Espaces ouverts et cultivés, près de l'Homme.

Nourriture : Petits mammifères, surtout des campagnols, oiseaux. Avale ses proies entières. Chasse la nuit, à l'ouïe.

Particularités : Vol silencieux. Un des plus beaux oiseaux qui soit. Elle contribue à limiter la pullulation des campagnols, ce qui fait d'elle une alliée de l'Homme. Malheureusement, son cri lugubre et son aspect fantomatique à l'origine des plus stupides superstitions lui ont valu les pires persécutions.

A La Roche : J'entends régulièrement à Lavergne ce cri à vous donner le frisson, Il y a quelques années, des voisins en ont trouvé une, bien vivante, dans leur grenier et ont été émerveillés par sa beauté.

11 **Chouette chevêche** - *Athene noctua*
Protégée

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Strigiformes
Strigidés

Nom local : Petiota suipa, Nechola (oiseau de nuit).

GB : Little Owl - D : Steinkauz - NL : Steenuil - I : Civetta - E : Mochuelo - DK : Kirkeugle - S :
Minervaugla.

Taille : 25 cm. E : 59 cm.


Description : Petite, trapue. Tête plate, front bas, "sourcils" blancs "froncés", yeux jaunes. Dessus brun foncé taché de blanc. Dessous blanchâtre rayé de larges bandes marron foncé. Queue courte.

Sédentaire

Habitat : Bocage, régions cultivées et dégagées avec de vieux arbres, vergers.

Nourriture : Très variée. Rongeurs et autres petits mammifères, insectes, grenouilles, vers de terre, quelques petits oiseaux. Entrepose parfois des réserves.

Particularités : Inquiète, elle fait des courbettes, comme montée sur ressort. Vol très onduleux. Seule chouette communément visible de jour. En consommant une grande quantité de rongeurs, elle aide à empêcher leur prolifération et est donc une alliée de l'homme.



A La Roche : Une des grandes figures de Lavergne. Un jour, des voisins ont trouvé une jeune Chevêche au fond de leur insert éteint ! Un peu choquée, elle s'est tout de même envolée... et a recommencé le lendemain !

12 **Chouette hulotte** - *Strix aluco*
(Chat huant) - Protégée

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Strigiformes
Strigidés

Nom local : Chavan.

GB : Tawny Owl - D : Waldkauz - NL : Bosuil - I : Alloco - E : Cárabo - DK : Natugle - S : Kattuggla.



Taille : 38 cm. E : 95 cm.

Description : **Grande chouette à grosse tête ronde**. Yeux noirs. Plumage sombre, du gris au roux selon les individus, et rayé de brun-noir. Taches blanches sur le dessus. Ailes arrondies, Queue courte.

Sédentaire

Habitat : Milieux boisés, parcs, grands jardins, même en ville.

Nourriture : Très variée. Rongeurs, petits oiseaux, insectes, invertébrés, batraciens, poissons. Elle aussi contribue à limiter la quantité d'insectes et de rongeurs qui s'attaquent aux cultures.

Particularités : **Strictement nocturne**. Son chant bien connu (ouou-ou-houhouhouhou) servait de cri de ralliement aux Chouans. Se cache le jour dans la végétation où les petits oiseaux la houpillent lorsqu'ils la découvrent.


A La Roche : A Lavergne et vers La Roche Basse : elles sont souvent plusieurs à se répondre.

13 **Martinet noir** - *Apus apus*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Apodiformes
Apodidés

GB : Swift - D : Mauersegler - NL : Gierzwaluw - I : Rondone - E : Vencejo común - DK : Mursejler - S : Tornsvåla.



Taille : 16 cm. E : 40 cm.

Description : En vol, plus grand que les hirondelles, **Uniformément brun noir**. Tache claire au menton. **Très longues ailes étroites en forme de faux**. Queue courte et échancrée (Hirondelles : ailes triangulaires et beaucoup plus courtes, ventre blanc, queue plus longue).

Migrateur : Présent de fin avril à septembre. Migre vers l'Afrique au sud du Sahara.

Habitat : Villes et villages.

Nourriture : Insectes capturés au vol. Peut jeûner assez longtemps par mauvais temps (état de vie ralentie).

Particularités : Vie essentiellement aérienne. Boit sans cesser de voler (technique dite "du Canadair"). Peut passer la nuit en altitude, se reposant dans les courants aériens. Niche dans les cavités des bâtiments.

A La Roche : Nichent notamment dans l'église. Les soirs d'été, on peut rester des heures à admirer leurs étourdissantes acrobaties, accompagnées de cris stridents. Mieux que la Patrouille de France ! (Note de l'éditeur : ces propos n'engagent que leur auteur !).


14 **Pic vert** - *Picus viridis*
(Pivert) - Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Piciformes
Picidés

Nom local : Picatal (Pichatau ou Pichatar) verd.

GB : Green Woodpecker - D : Grünspecht - NL : Groene specht - I : Picchio verde - E : Pito real - DK : Grønspætte - S : Gröngöling.



Taille : 31 cm.

Description : Dessus vert. Croupion jaunâtre bien visible en vol. Dessous gris-vert pâle. Calotte rouge. Moustache noire chez la femelle, rouge entre deux fines bandes noires chez le mâle. Long bec en forme de poignard.

Sédentaire.

Habitat : Bois clairs de feuillus et mixtes, avec de vieux arbres, campagne avec bosquets, parcs.

Nourriture : Limaces, escargots, vers de terre, graines et fruits en petite quantité. Mange aussi des fourmis qu'il englut sur sa langue très longue et des insectes xylophages ("mangeurs de bois") avec leurs larves.

Particularités : Vol très onduleux. Tambourinage long et peu fréquent, servant surtout à marquer son territoire. Pour les cours de percussion, s'adresse à l'[Epeiche](#). Creuse son nid dans un arbre mort.

A La Roche : On entend souvent le Pivert lancer ses "éclats de rire" sonores (kiakiakiakiakiak) en bas de Lavergne, près du dépôt de sel, où on l'aperçoit parfois.

15 **Pic épeiche** - *Dendrocopos major*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Piciformes
Picidés

Nom local : Picatal (Pichatau ou Pichatar) roge.

GB : Great Spotted Woodpecker, Pied Woodpecker - D : Grosse Buntspecht, Rotspecht - NL : Grote bonte specht - I : Picchio rosso maggiore - E : Pico picapinos - DK : Stor Flagspætte - S : Större hackspett.



Taille : 22 cm.

Description : **Hoir, blanc et rouge** Dessous blanc, sauf le bas-ventre et les sous-caudales rouge vif. Calotte noire. **Deux taches blanches très visibles aux épaules.**

Sédentaire

Habitat : Bois de feuillus, conifères ou mixtes, parcs.

Nourriture : Récoltée surtout dans les arbres. Insectes et larves, araignées, œufs, graines de conifères et de feuillus, baies et fruits. L'Epeiche transporte jusqu'à sa "forge" - un arbre - les cônes ("pommes de pins") qu'il coince et attaque avec son bec. Il les jette "après usage" et on peut repérer la forge par l'amoncellement de cônes déchiquetés au pied de l'arbre.

Particularités : **Vol très onduleux.** Tambourinage très fréquent, sauf l'été, et très bref. Creuse, comme le Pic vert, son nid dans un arbre mort.

A La Roche : Le plus abondant des Pics, présent dans tous les bois de la commune.

16 **Pic épeichette** - *Dendrocopos minor*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Piciformes
Picidés

Nom local : Picatal (Pichatau ou Pichatar) petiot.

GB : Lesser Spotted Woodpecker - D : Kleinspecht, Kleiner Buntspecht, Zwergspecht - NL : Kleine bonte specht - I : Picchio rosso minore - E : Pico menor - DK : Lille Flagspætte - S : Mindre hackspett.



Taille : 14 cm.

Description : Taille du moineau. Dessus barré noir et blanc. Dessous blanchâtre, quelques raies sombres au flanc. Pas de rouge aux sous-caudales. Mâle : calotte rouge. Femelle : calotte blanchâtre.

Sédentaire

Habitat : Bois et bosquets de plaine, essentiellement feuillus, parcs, vergers, jardins.

Nourriture : Insectes xylophages ("mangeurs de bois") et leurs larves, coléoptères, chenilles, pucerons, diptères, fourmis. Très peu de graines.

Particularités : Evolue généralement à la cime des arbres. Se joint parfois aux compagnies de Mésanges en hiver. Tambourinage long, uniforme, assez peu sonore.

A La Roche : Vu non loin ou Pont Madame où il cherchait des insectes dans un groupe de châtaigniers morts qui ont été coupés depuis. Il était en compagnie d'une Fauvette à tête noire, d'une Fauvette grisette, d'un Rouge-queue à front blanc, d'un Troglodyte et d'une Mésange nonnette. Un vrai festival !


17 **Hirondelle rustique** - *Hirundo rustica*
(Hirondelle de cheminée) - Protégée

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Hirundinidés

Nom local : Iroundela, Irounda, L'occitan ne distingue pas les deux espèces.

GB : Swallow - D : Rauchschwalbe - NL : Boerenzwaluw - I : Rondine - E : Golondrina común - DK : Landsvale - S : Ladusvala.



Taille : 19 cm - E : 33 cm.

Description : Dessus uniformément bleu métallique sombre.

Front et gorge brun rouge. Bande pectorale bleu foncé.

Dessous blanc crème. Ailes longues. Queue très fourchue : deux longs "filets" (rectrices) à la queue (plus longs chez le mâle).

Migratrice : Présente de fin mars à octobre, Migre vers l'Afrique au sud du Sahara.

Habitat : Campagne cultivée et habitée.

Nourriture : Insectes capturés au vol.

Particularités : Oiseau aérien, mal à l'aise au sol où il ne vient que pour collecter la boue pour son nid. Les jeunes passent la nuit dans des étendues de roseaux par dizaines, voire centaines de milliers. Nid ouvert, cimenté avec de la salive et de la boue, construit souvent dans une grange ou une étable. La disparition des étables « habitées » leur est préjudiciable.

A La Roche : Avant la migration d'automne, elles ont coutume de se rassembler par centaines sur les fils électriques au croisement de la route de Tulle et du chemin de Lavergne. Sinon, on les voit surtout autour et dans les fermes et les granges, dans toute la commune.


18 **Hirondelle de fenêtre** - *Delichon urbica*
Protégée

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Hirundinidés

Nom local : Iroundela, Irounda, L'occitan ne distingue pas les deux espèces.

GB : House Martin - D : Mehlschwalbe - NL : Huiszwaluw - I : Balestruccio - E : Avión común - DK : Bysvale - S : Hussvala.



Taille : 13 cm, E : 28 cm.

Description : Plus petite que l'Hirondelle rustique, ailes proportionnellement plus courtes. **Dessus bleu-noir** brillant. **Croupion blanc** très visible en vol. Dessous blanc. **Queue courte**, légèrement échancrée.

Migratrice : Présente de fin mars à octobre. Migre vers l'Afrique au sud du Sahara.

Habitat : Villes et villages.

Nourriture : Insectes capturés au vol.

Particularités : Active dès avant le lever du soleil et jusque tard le soir. Ne fréquente presque jamais les roselières (étendues de roseaux). Sensible aux pollutions et au goudronnage des routes qui la privent de boue pour son nid, elle déserte maints endroits où elle était familière. Nid globulaire cimenté de boue et de salive durcies, construit à l'extérieur des bâtiments, souvent sous le rebord du toit. Il est interdit de détruire leurs nids.


A La Roche : Abondante dans le bourg, présente aussi aux Quatre-Routes.

19 **Bergeronnette des ruisseaux** - *Motacilla cinerea* [↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)
(Hochequeue, Lavandière jaune) - Protégée

Passeriformes
Motacillidés

Nom local : Bargieira jauna.

GB : Grey Wagtail - D : Gebirgstelze - NL : Grote gele kwikstaart - I : Ballerina gialla - E : Lavandera cascadeña - DK : Bjergvipstjert - S : Forsårla.



Taille : 18 cm.

Description : Svelte. Très longue queue noire bordée de blanc. Dessus gris cendré. Croupion jaune-vert. Dessous jaune vif. Sourcils et «moustaches blancs. Mâle : bavette noire (hiver : blanchâtre). Femelle : bavette blanchâtre.

Migrateur partiel : Migre vers le sud de l'Europe et l'Afrique du Nord.

Habitat : Là où il y a de l'eau et des pierres : ruisseaux, rivières, lacs, étangs. Observable loin des cours d'eau en-dehors de la période de nidification.

Nourriture : Insectes et larves, parfois petits crustacés et mollusques. Chasse au bord de l'eau, parfois dedans ou bien sur les tas de fumier.

Particularités : Hoche la queue presque sans arrêt. Vol très onduleux. Ne va pas près du bétail, contrairement à sa cousine la [Bergeronnette grise](#).

A La Roche : A l'étang du Clos et au Moulin de Larchat.


20 **Bergeronnette grise** - *Motacilla alba*
(Lavandière grise, Hochequeue gris) - Protégée

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Motacillidés

Nom local : Bargieira gresa.

GB : White Wagtail / race anglaise M. a. yarellii : Pied Wagtail - D : Bachstelze - NL : Witte kwikstaart - I :
Ballerina bianca - E : Lavandera blanca - DK : Hvid Vipstjert - S : Sädesärkla.



Taille : 18 cm.

Description : Svelte. **Dessus gris.** Ailes aux plumes noires liserées de blanc. Longue queue noire bordée de blanc, ventre blanc. **Calotte, nuque, menton et gorge noirs.** Femelle : moins de noir à la tête. Hiver : calotte plus grise, menton et gorge blancs, sauf croissant noirâtre à la poitrine.

Migrateur partiel : Observable toute l'année, Migre vers le sud de l'Europe et l'Afrique du Nord.

Habitat : Campagne ouverte, souvent près de l'Homme. Fréquemment au voisinage de l'eau.

Nourriture : Insectes et larves, petits mollusques, vers, Picorés à terre ou dans l'eau ou bien happés au vol.

Particularités : **Hoche la queue incessamment,** d'où son nom dans plusieurs langues. **Souvent au milieu des troupeaux** ou derrière la charrue, Un des "hôtes" du Coucou, Après la période des nids, se rassemblent la nuit en dortoirs dans les arbres


A La Roche : Aux Quatre-Routes sur la route et à Lavergne entre les pattes des Limousines.

21 **Troglodyte mignon** - *Troglodytes troglodytes* [↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)
Protégé

Passériformes
Troglodytés

Nom local : Rei de belet.

GB : Wren - D : Zaunkönig - NL : Winterkoning - I : Scricciolo - E : Chochin - DK : Gærdesmutte - S : Gärdsmyg.



Taille : 10 cm.

Description : Très petit oiseau brun, tout rond, à la courte queue dressée. Plumage barré, Sourcil blanchâtre, Bec long et fin légèrement arqué. Ailes courtes et arrondies.

Migrateur partiel

Habitat : Végétation basse et fourrés des bois et parcs, rochers, volontiers près de l'eau.

Nourriture : Insectes, chenilles, larves, araignées. Chasse surtout au sol.

Particularités : Très vif. Son chant, une succession de trilles en trois strophes, est étonnamment sonore, vu la taille du personnage. Vol direct et rapide, les ailes vibrant comme celles des insectes. Les mâles construisent plusieurs nids : les femelles choisissent le meilleur maçonn.

A La Roche : Commun le long du ruisseau des Vergnes jusqu'au Doustre et autour du Moulin de Larchat. Mais on le rencontre presque partout : Lavergne, Laborde, La Roche Haussière.

22 **Accenteur mouchet** - *Prunella modularis*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Prunellidés

GB : Dunnock, Hedge Sparrow - D : Heckenbraunelle - NL : Heggemus - I : Passera scopaiola - E : Acentór común -
DK : Jernspurv - S : Järnsparv.

Taille. : 15 cm.


Description : Distingué du Moineau par la **tête et la poitrine gris plomb et le bec fin**. Dessus brun rayé de brun-noir Flancs rayés de noirâtre.

Migrateur partiel

Habitat : Forêts mixtes claires, jeunes plantations de conifères : haies, taillis, buissons, parcs.

Nourriture : Se nourrit à terre d'insectes, larves, araignées et de graines.

Particularités : Discret, il se montre peu à découvert. C'est un des rares oiseaux, avec le [Rouge-gorge](#) qui chante aussi au cœur de l'hiver. Souvent parasité par le [Coucou](#). Plutôt solitaire, sauf parfois en hiver.



A La Roche : Il aime bien chanter du haut d'un arbuste au bord du chemin de la 6leygeolle. J'en ai vu un picorer des bouses (ma foi !) tout en haut de Lavergne.

23 **Rougegorge familier** - *Erithacus rubecula*
Protégé

[↑ Sommaire](#)

[↓ Index](#)

Passériformes
Turridés

Nom local : Pamparol, Pamparou.

GB : Robin - D : Rotkehlchen - NL : Roodborst - I : Pettiroso - E : Petirrojo - DK : Rødhals - S : Rödake.

Taille : 14 cm.


Description : Petit oiseau rond au bec fin et aux grands yeux noirs. Dessus olivâtre. Front et plastron orangés, bordés d'une frange grisâtre. Ventre blanchâtre.

Migrateur partiel : Présent toute l'année. En hiver, nombreux visiteurs venus du Nord.

Habitat : Forêts, taillis, haies, parcs, jardins, jusque dans les villes.

Nourriture : Cherche à terre insectes, larves, araignées, mollusques, baies. Ne dédaigne pas les miettes et la graisse.

Particularités : Fait entendre presque toute l'année son chant un peu mélancolique. Défend son territoire avec détermination et agressivité. Souvent très familier dans les jardins, il est plutôt discret dans les bois.



A La Roche : Qui ne l'a vu, à l'automne, épier le jardinier dont chaque coup de bêche lui déniche quelque bestiole succulente ? Présent sur tout le territoire de la commune dans les bois et les jardins.


24 **Rougequeue noir** - *Phoenicurus ochruros*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Turdidés

Nom local : Quoua rosa (ou roge). L'occitan ne distingue pas les deux espèces.

GB : Black Redstart - D : Hausrotschwanz - NL : Zwarte roodstaart - I : Codirosso spazzacamino - E : Collirojo tizon - DK : Husrødstjert - S : Svart Rödstjärt.



Taille : 14 cm.

Description : **Queue tremblante roux orangé** et croupion roux. **Mâle : noir de suie**, tache blanche sur l'aile ; plus pâle en automne. Femelle : gris brunâtre sombre dessus et dessous.

Migrateur partiel

Habitat : Rochers et falaises des montagnes et parfois des côtes maritimes, villes, villages, ruines.

Nourriture : Insectes happés au vol ou picorés à terre, vers, araignées ; baies en automne.

Particularités : Du haut d'une cheminée, d'un toit ou de la cime d'un sapin, le mâle lance son chant caractéristique en trois strophes dont la seconde rappelle le bruit du papier que l'on froisse. Souvent parasité par le [Coucou](#).

A La Roche : Commun à Lavergne, au Bourg, aux Quatre-Routes.

25 Rougequeue à front blanc - *Phoenicurus phoenicurus*


Protégé

Passériformes

Turdidés

Nom local : Quoua rosa (ou roge).

GB : Redstart - D : Gartenrotschwanz - NL : Roodstaart - I : Codirosso - E : Collirojo real - DK : Rødstjert - S : Rødstjärt.



Taille : 14 cm.

Description : Queue tremblante rouge orangé et croupion roux. Mâle : front blanc, face et gorge noires, poitrine et flancs rouge orangé, dessus gris. Femelle : beaucoup plus pâle et brune que femelle [Rougequeue noir](#).

Migrateur : Présent de mi-avril à fin septembre. Migre vers l'Afrique tropicale.

Habitat : Régions boisées ; lisières et clairières des bois ; parcs, jusque dans les villes.

Nourriture : Insectes capturés en vol sur place ou à terre ; vers, araignées, limaces ; baies en automne.

Particularités : Superbe ! Aime les arbres, alors que le [Rougequeue noir](#) a une préférence pour le minéral. Semble souffrir de l'épandage de pesticides.

A La Roche : Hôte de charme de mon jardin à Lavergne. Je l'ai vu aussi dans une clairière près du Pont Madame, en compagnie du Pic épeichette.

26 **Traquet pâtre** - *Saxicola torquata*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Turridés

GB : Stonechat - D : Schwarzkehlchen - NL : Roodborsttapuit - I : Saltimpalo - E : Tarabilla común - DK : Sortstrubet Bynkefugl - S : Svarthakad Buskskvätta..

Taille : 12 cm.


Description : Petit oiseau. Mâle : tête et gorge noires , tache blanche de chaque côté du cou ; dessus brun-noir avec tache blanche sur l'aile et le croupion ; poitrine roux orangé, ventre crème. Femelle : assez semblable mais brun rayé dessus et sans tache blanche au croupion.

Migrateur : Présent de mars à début octobre. Migre vers l'Espagne et l'Afrique du Nord.

Habitat : Lieux dégagés avec buissons et herbes sèches ; landes, friches, talus négligés, bords des routes.

Nourriture : Insectes et larves happés au vol ou capturés à terre ; araignées, mollusques.


Particularités : Aime se percher à l'affût sur un poste élevé et dégagé : fil de téléphone, piquet de clôture, pointe d'un arbre. Montre sa nervosité par des courbettes saccadées.



A La Roche : A La Roche Haussière.

Nom local : Merle (estufleire).

GB : Blackbird - D : Aasel - NL : Merel, Zwarte lijster - I : Merlo nero - E : Mirlo común - DK : Solsort - S : Koltrast.



Taille : 24 cm.

Description : Queue longue, ailes assez courtes. **Mâle : noir avec bec et cercle oculaire jaune orangé vif.**
Femelle : brune, dessous tacheté, bec sombre.

Migrateur partiel

Habitat : Bois, haies, parcs, jardins, buissons.


Nourriture : Vers attirés en surface par un trépignement ; baies et fruits sauvages ou cultivés. Ne dédaigne pas non plus les mangeoires.

Particularités : Très émotif, il n'aime pas être surpris et s'enfuit alors en poussant des cris paniques. La femelle sait simuler une blessure lorsqu'elle veut attirer sur elle, et ainsi éloigner du nid les indésirables (prédateurs ou ornithologues). Chant pur, tranquille et musical, lancé surtout à l'aube et au crépuscule, d'un point élevé.

A La Roche : Partout, aussi bien dans les bois qu'autour des maisons.

Nom local : Petio griva (tour, tourda).

GB : Song Thrush - D : Singdrossel - NL : Zanglijster - I : Tordo - E : Zorzal común - DK : Sangdrossel - S : Taltrast.



Taille : 22 cm.

Description : Plus petite que le Merle. Dessus brun. Dessous blanc, semé de nombreuses petites taches brun noir. Poitrine et flancs lavés de roussâtre. Zone beige orangé sous l'aile. (Voir : [Grive draine](#))

Sédentaire. Des oiseaux nordiques viennent hiverner en Limousin.

Habitat : Forêts de feuillus, d'épicéas ou mixtes, bosquets, parcs et jardins. Volontiers près de l'eau.


Nourriture : Insectes, larves, vers, mollusques, capturés à terre. Casse la coquille des escargots sur son "enclume" favorite (une pierre). Baies et fruits sauvages ou cultivés (Ex : raisins - personne n'est parfait !).

Particularités : Craintive. Chant sonore et flûté où chaque motif est répété 2 ou 3 fois. Nid remarquable : l'intérieur est enduit d'une pâte de bois et de boue durcie et lisse.

A La Roche : Concerts réguliers au Festival de printemps, à Lavergne, au Bourg, sur la route de Saint Martin.

Nom local : Tria.

GB : Mistle Thrush - O : Misteldrossel - NL : Grote lijster - I : Tordela - E : Zorzal charlo - DK : Misteldrossel - S : Dubbeltrast.



Taille : 26 cm.

Description : Plus grande que le Merle. Dessus brun gris. Dessous blanc parsemé de grandes taches sombres plutôt rondes. Zone blanche sous l'aile (Voir : [Grive musicienne](#)). Coins blancs à la queue.

Migrateur partiel : Observable toute l'année.

Habitat : Bois, lisières, bosquets, clairières, parcs, vergers.

Nourriture : Vers, mollusques, insectes, araignées, cherchés dans les prairies ou clairières ; fruits et baies, surtout celles du gui dont elle dissémine les graines (Nom scientifique : mangeuse de gui").

Particularités : Chante même par mauvais temps. Parvient à faire fuir les chats et les rapaces, mais reste méfiante envers l'Homme - on se demande pourquoi !

A La Roche : A Laborde, Lavergne, au Bourg.

30 **Hypolais polyglotte** - *Hippolais polyglotta*
Protégée

[↑ Sommaire](#)

[↓ Index](#)

Passériformes
Sylviidés

Nom local : Barbarote.

GB : Melodious Warbler - D : Orpheusspötter - NL : Orpheusspotvogel - I : Canapino - E : Zarcero común - DK : Spottesanger - S : Polyglottgulsångare.

Taille : 13 cm.


Description : Dessus brun olivâtre. Dessous et sourcils jaunes. Ailes courtes et arrondies. Chant caractéristique (Voir : Particularités).

Migrateur : Présent de mi-avril à mi-septembre. Migre vers l'Afrique tropicale.

Habitat : Buissons, haies, broussailles, bosquets bien ensoleillés ; bois clairs ; parcs, jardins, Souvent au voisinage de l'eau.

Nourriture : Insectes, larves, chenilles, araignées, capturés dans les feuillages élevés.

Particularités : Chant : gazouillis précipité, orné de quelques imitations d'autres oiseaux et précédé d'une introduction de notes détachées. Imite en réalité à peu près n'importe quoi, d'où son nom dans plusieurs langues : « oiseau moqueur ».



A La Roche : A Lavergne, près du ruisseau des Vergnes, je connais un fourré inextricable (j'espère qu'il le restera), véritable repère de Fauvettes et autres petits Passereaux où "Hypo" vient haranguer les foules.


31 **Fauvette grisette** - *Sylvia communis*
Protégée

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Sylviidés

Nom local : Fauveta (le même Nom pour toutes les fauvettes).

GB : Whitethroat - D : Dorngrasmücke - NL : Grasmus - I : Sterpazzola - E : Curruca zarcera - DK : Tornanger - S : Törnsångare.



Taille : 14 cm.

Description : **Gorge blanc pur**. Ailes rousses. Dessus brun. Longue queue bordée de blanc. **Mâle : tête grise jusqu'au-dessous des yeux**, poitrine nuancée de rose. Femelle : tête brune, poitrine plus terne.

Migratrice : Présente de mi-avril à mi-septembre. Migre vers l'Afrique tropicale au sud du Sahara.

Habitat : Végétation basse et dense : buissons, broussailles, ronces, orties, ajoncs ; cultures de colza, luzerne.

Nourriture : Insectes, araignées, mollusques ; fruits et baies en automne.

Particularités : Hérisse souvent les pluies de la tête. Eloigne du nid les intrus en simulant une blessure. Chante aussi en vol. Très remuante.

A La Roche : A Lavergne, dans le fourré à Fauvettes (Voir : [Hypolaïs polyglotte](#)).


32 **Fauvette des jardins** - *Sylvia borin*
Protégée

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Sylviidés

Nom local : Fauveita (Voir : Fauvette grisette).

GB : Garden Warbler - D : Gartengrasmücke - NL : Tuinfluiter - I : Beccafico - E : Curruca mosquitera - DK : Havesanger - S : Trädgårdssångare.



Taille : 14 cm.

Description : Reconnaisable à... **l'absence de tout signe distinctif**. Dessus brun-gris uniforme. Dessous pâle. Bec assez court. Tête ronde.

Migrateur : Présente de mi-avril à mi-septembre. Migre vers l'Afrique tropicale au sud du Sahara.

Habitat : Sous-bois touffus, taillis, fourrés ; parcs et jardins avec végétation dense.

Nourriture : Insectes, chenilles ; en été, fruits et baies dont le jus barbouille parfois son plumage.

Particularités : Discrète. Non seulement elle s'habille de façon à ne pas attirer les regards mais, en plus, elle se cache dans les feuillages, même pour chanter. Beau chant, mélodieux, soutenu, non flûté, sans notes accentuées (Voir : [Fauvette à tête noire](#)).

A La Roche : Elle vient au Bourg, à la Roche Haussière, à Lavergne et sûrement dans bien d'autres endroits : aigüisez l'œil et tendez l'oreille !

33 Fauvette à tête noire - *Sylvia atricapilla* [↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)
Protégée


Passériformes
Sylviisés

Nom local : Fauveta (Voir : Fauvette grisette).

GB : Blackcap - D : Mönchsgrasmücke - NL : Zwartkop - I : Capinera - E : Curruca capirotada - DK : Munk - S : Svarthätta.

Taille : 14 cm.

Description : Calotte bien marquée, au-dessus de l'œil, noire chez le mâle, rousse chez la femelle. Dessus brun grisâtre. Dessous, cou et joues gris. Femelle plus brunâtre dessous.



Migrateur partiel : Quelques hivernantes en basse altitude dans le Limousin. Migre vers l'Afrique du Nord et le sud du Sahara.

Habitat : Sous-bois, taillis, haies ; parcs et jardins avec buissons et arbres.

Nourriture : Insectes, larves, araignées ; fruits et baies.


Particularités : Les parents éloignent les intrus en simulant une blessure. Chant varié, flûté, avec un final de notes distinctes, plus fort que le début (Voir : [Fauvette des jardins](#)).

A La Roche : Au printemps, je fais rarement une sortie sans noter sur mon calepin : "ftn", nom de code de l'intéressée. On peut la voir et surtout l'entendre sur tout le territoire de la commune.

34 **Pouillot siffleur** - *Phylloscopus sibilatrix* [↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)
Protégé

Passériformes
Sylviidés

Nom local : On appelait "pacharéou" ("ceux qui ne font que passer") les petits oiseaux difficiles à déterminer.
GB : Wood Warbler - D : Waldlaubsänger - NL : Fluiter - I : Lui verde - E : Mosquitero silbador - DK : Skovsanger - S : Grönsångare.



Taille : 12,5 cm.

Description : Dessus vert jaunâtre. **Gorge et poitrine jaune soufre**. Ventre blanc pur. **Sourcils jaunes** bien marqués. Longues ailes.

Migrateur : Présent de mi-avril à septembre. Migre vers l'Afrique tropicale.

Habitat : Futaies claires de hêtres, chênes ou charmes ; forêts mixtes, bosquets, parcs.

Nourriture : Petits insectes, larves et araignées, pris assez haut dans les feuillages. *Phylloscopus* signifie "Inspecteur des feuilles", et c'est exactement ce qu'il fait !

Particularités : Deux chants : une cascade flûtée descendante et une série de notes s'accélégrant en trille, comme une mobylette qui démarre (poésie quand tu nous tiens !).

A La Roche : Dans une charmille en haut de Lavergne, j'ai pu l'admirer pendant une demi-heure : chants, ballet entre les branches, rien ne manquait au spectacle.

35 **Pouillot véloce** - *Phylloscopus collybita*
Protégé


[↑ Sommaire](#)

[↓ Index](#)

Passériformes
Sylviidés

Nom local : Voir : Pouillot siffleur.

GB : Tchiffitchaff - D : Zilpzalp - NL : Tjiftjaf - I : Lui piccolo - E : Mosquitero común - DK : Gransanger - S : Gransångare.



Taille : 11 cm.

Description : Dessus brun-olive verdâtre. Dessous beige clair nuancé de jaune. Identifiable surtout par le **chant** (Voir : Particularités).

Migrateur partiel : Observable toute l'année. Migration en mars et septembre. Migre vers les pays méditerranéens ou la lisière sud du Sahara.

Habitat : Bois de toutes sortes, avec buissons.

Nourriture : Petits insectes, larves, chenilles, araignées, chassés dans les feuillages.

Particularités : A part peut-être celui du Coucou, il n'est pas de chant plus facile à reconnaître que celui de "l'Inspecteur des feuilles compteur d'écus" (c'est son nom scientifique). "Tchif, tchaf, tchif, tchaf,,,,, Deux notes égrenées sans précipitation inutile : un sou, deux sous, trois sous ... Pas véloce pour deux sous.

A La Roche : Dans tous les bois où il compte ses écus, mais n'est pas avare de son petit refrain !

36 **Roitelet huppé** - *Regulus regulus*

Protégé

[↑ Sommaire](#)


[↓ Index](#)

Passériformes

Sylviidés

Nom local : Voir : Pouillot siffleur.

GB : Goldcrest - D : Wintergoldhähnchen - NL : Goudhaantje - I : Regolo - E : Reyazuelo sencillo - DK : Fuglekonge - S : Kungsfågel.



Taille : 9 cm.

Description : Très petit. Dessus gris-vert, Dessous plus pile, Aile marquée de deux traits blancs et d'une bande noire, Sur le haut du crâne, bande jaune vif bordée de noir, ornée au centre d'un trait orange chez le mâle et se hérissant en crête dans l'excitation. (Voir : [Roitelet triple-bandeau](#)).

Migrateur partiel : Observable toute l'année.

Habitat : Epicéas et autres conifères ; en hiver, aussi dans les haies, parcs, sous-bois.

Nourriture : Petits insectes, leurs larves et leurs œufs ; araignées.

Particularités : Difficile de le distinguer du "triple-bandeau" à cause de son habitude contestable de fréquenter les endroits mal éclairés et cette manie agaçante de remuer tout le temps. Nid en forme de sphère avec une ouverture au sommet.


A La Roche : Aperçu le long du Chemin de la Gleygeolle et autour de l'étang de Laborde.

37 **Roitelet triple-bandeau** - *Regulus ignicapilla* [↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)
Protégé

Passériformes
Sylviidés

Nom local : Voir : Pouillot siffleur.

GB : Firecrest - D : Sommergoldhähnchen - NL : Vuurgoudhaantje - I : Fiorrancino - E : Reyezueto listado - DK : Rødtoppet Fuglekonge - S : Brandkronad kungsfågel.



Taille : 9 cm.

Description : Distingué du [Roitelet huppé](#) par : le **sourcil blanc très net, le trait noir en travers de l'œil**, le manteau plus vert, le ventre plus blanc et une tache vert bronze de chaque côté du cou.

Migrateur partiel

Habitat : Forêts de conifères et mixtes ; parcs, buissons.

Nourriture : Petits insectes, leurs larves et leurs œufs ; araignées.

Particularités : Partage avec le Roitelet huppé l'honneur d'être le plus petit oiseau d'Europe. Voix suraiguë, un peu plus sonore que celle du "huppé". Serait plus migrateur. Habitat moins restreint aux conifères. Sa petite taille le rend vulnérable aux hivers rigoureux. Nid sphérique de mousses et lichens liés par des fils de cocons d'araignées.


A La Roche : Je l'ai vu une seule fois, au Bourg. C'est peu ! Et vous ?

38 **Gobemouche gris** - *Muscicapa striata*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Muscicapidés

GB : Spotted Flycatcher - AD : Grauschnäpper - NL : Grauwe vliegenvanger - I : Pigliamosche - E : Papamoscas gris - DK : Grå Fluesnapper - S : Grå Flugsnappare.



Taille : 14 cm.

Description : Dessus gris-brun, Dessous blanchâtre. Dessus de la tête et **poitrine rayés de sombre**. Frémit souvent des ailes et de la queue.

Migrateur : Présent d'avril à septembre. Migre vers l'Afrique au sud du Sahara.

Habitat : Bois clairs, futaies, lisières : parcs, jardins. Souvent près des habitations.

Nourriture : Insectes volants ; baies en automne.

Particularités : Se poste aux aguets en un point stratégique, sur un poteau, une branche ou un fil d'où il s'élance fréquemment pour capturer une bestiole, après une courte chasse acrobatique. Puis il revient à son perchoir pour consommer sa proie et guetter la suivante.

A La Roche : Pris en flagrant délit de chasse à l'affût à Lavergne, en pleine période de fermeture !

39 **Gobemouche noir** - *Ficedula hypoleuca*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Muscicapidés

GB : Pied Flycatcher - D : Trauerschnäpper - NL : Bonte vliegenvanger - I : Balia nera E : Papatoscas cerrojillo
- DK : Broget Fluesnapper - S : Svartvit Flugsnappare.

Taille : 13 cm.


Description : **Mâle : blanc et noir**. dessus noir (gris-brun en automne-hiver), Front, **dessous**, bords de la queue et **large barre alaire blancs**. Femelle : dessus gris-brun, dessous gris pâle.

Migrateur : Présent d'avril à septembre. Migre vers l'Afrique tropicale.

Habitat : Bois clairs de feuillus ou mixtes, avec vieux arbres ; parcs, vergers.

Nourriture : Insectes et larves ; araignées, mollusques ; baies à l'automne.

Particularités : Posé, il agite souvent les ailes et la queue. Ses techniques de chasse sont plus variées que celles du [Gobemouche gris](#) : à l'affût, il change de perchoir, il chasse aussi à terre et dans les cimes des arbres.




A La Roche : Il est venu, avec Madame, passer une brève matinée dans mon jardin, à Lavergne.

40 **Mésange à longue queue** - *Aegithalos caudatus* [↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)
Protégée

Passériformes
Aegithalidés

Nom local : Sinzilio (Sinzilia) quoua lonja.

GB : Long-tailed Tit - D : Schwanzmeise - NL : Staartmees - I : Codibugnolo - E : Mito - DK : Halemejse - S : Stjærtmes.



Taille : 13 cm (Queue : 7 cm).

Description : Tête blanche avec deux bandeaux noirs. Très longue queue noire bordée de blanc. Dessous blanc teinté de rosé. Dessus brun sauf les épaules et le croupion rosés (Race nordique : tête et dessous blancs). Marque blanchâtre sur l'aile.

Migrateur partiel : Présente toute l'année.

Habitat : Bois de feuillus et mixtes, parcs, bosquets, haies.

Nourriture : Petits insectes, leurs œufs et larves, araignées, très peu de graines.

Particularités : En automne et en hiver, elles se déplacent en compagnies et s'appellent constamment avec de petits cris aigus. Comportement agité et acrobaties la tête en bas comme chez les "vraies" Mésanges du genre Parus. Joli nid en forme d'œuf.

A La Roche : Fréquente Lavergne, les abords de l'étang de Laborde, le Moulin de Larchat.

41 **Mésange nonnette** - *Parus palustris*

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes

Protégée

Paridés

Nom local : Sinzilio (Sinzilia) petiota testa negra (negre).

GB : Marsh Tit - D : Sumpfmeise - NL : Glanskopmees - I : Cincia bigia - E : Carbonero palustre - DK : Sumpmejse
- S : Kärmes.



Taille : 12 cm.

Description : **Calotte et menton noirs** et brillants, Dessus brun-gris, Joues et dessous blanc grisâtre. **Pas de tache blanche à la nuque** ni de barres alaires (Voir : [Mésange noire](#)).

Sédentaire.

Habitat : Bois de feuillus, bosquets, haies, parcs.

Nourriture : Insectes, graines et baies en été et automne. Cherche sa nourriture aussi bien dans les herbes et fourrés qu'à la cime des arbres.

Particularités : Se mêlent aux autres Mésanges mais en petit nombre, souvent pas plus de deux ou trois.

A La Roche : A Lavergne ainsi que près du Pont Madame.


42 **Mésange huppée** - *Parus cristatus*
Protégée

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Paridés

Nom local : Sinzilio, Sinzilia (Mésange).

GB : Crested Tit - D : Haubenmeise - NL : Kuifmees - I : Cincia col ciuffo - E : Herrerillo capuchino - DK : Topmejse - S : Tofsmes.



Taille : 12 cm.

Description : **Huppe pointue, noire et blanche**. Joux blanches marquées d'une "virgule" noire partant de l'œil. **Menton, gorge et collier noirs**. Dessus brun-gris. Dessous blanchâtre. Flancs roussâtres.

Sédentaire

Habitat : Forêts de conifères. Mais aussi mixtes ou de feuillus, parcs avec conifères.

Nourriture : Insectes, larves et chrysalides, graines, surtout de conifères, en hiver. Cherche sa nourriture en s'agrippant aux troncs comme un [Grimpereau](#). Présente aux tables de nourrissage. Stocke parfois des réserves.

Particularités : Cri roulé "gurr" accompagné de "tsi, tsi" aigus. Pas farouche avec tout le monde : on a trouvé un nid de Mésanges huppées dans le flanc d'une aire de rapaces... occupée !

A La Roche : A La Roche Haussière, autour de l'étang de Laborde, en haut de Lavergne Par un beau jour d'hiver, l'une d'elle vagabondait dans mon jardin en compagnie de Mésanges bleues, nonnettes et à longue queue.


43 **Mésange noire** - *Parus ater*
Protégée

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Paridés

Nom local : Sinzilio (Sinzilia) testa negra.

GB : Coal Tit - D : Tannen meise - NL : Zaarte mees - I : Cincia mora - E : Carbonero garrapinos - DK : Sortmejse - S : Svartmes.



Taille : 11 cm.

Description : Calotte et bavette noires, Joux blanches, **Tache blanche à la nuque et double barre alaire blanche** étroite caractéristiques de l'espèce (Voir : [Mésange nonnette](#)). Dessous blanchâtre. Flancs jaunâtres.

Sédentaire : Apport d'oiseaux du Nord et de l'Est en hiver.

Habitat : Forêts de conifères et mixtes, parfois de feuillus ; parcs avec conifères.

Nourriture : Insectes, larves et araignées : graines de conifères extraites des cônes ou picorées à terre. Parcourt aussi les troncs, façon [Grimpereau](#), pour chercher sa nourriture.

Particularités : Très sociable : souvent en compagnie des Mésanges huppées et des Roitelets. Peu farouche à l'égard de l'Homme. Très vive et mobile.

A La Roche : A Lavergne, au ruisseau des Vergnes, à la Roche Haussière. Il lui a pris la fantaisie, une année, de nicher entre les racines apparentes d'un charme, dans le talus qui borde le chemin de Lavergne, au vu et au su de tout le monde !


44 **Mésange bleue** - *Parus caeruleus*
Protégée

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Paridés

Nom local : Sinzilio (Sinzilia) testa bleu, blau ou blua.

GB : Blue Tit - D : Blaumeise - NL : Pimpelmees - I : Cinciarella - E : Herrerillo común - DK : Blåmejse - S : Blåmes.



Taille : 11, 5 cm.

Description : **Calotte bleue cobalt** bordée de blanc. **Ailes et queue bleues**. Joues blanches. Trait noir au travers de l'œil. Menton et collier noirs. Dessus verdâtre. **Dessous jaune**.

Migrateur partiel

Habitat : Bois de feuillus ou mixtes, parcs, jardins, vergers, roselières (étendues de roseaux) en hiver.

Nourriture : Insectes, chenilles, araignées ; en hiver, cherche des chrysalides dans les roseaux et des graines dans les mangeoires.

Particularités : Acrobate émérite, on la voit souvent se balancer le ventre en l'air à l'extrémité des plus fins rameaux où elle cherche quelque araignée ou autre friandise.

A La Roche : Elles sont partout : Lavergne, le Bourg, le Moulin de Larchat, la Roche Haussière, la Croix de Laborie, le long de la route de Saint Martin.

45 **Mésange charbonnière** - *Parus major*
Protégée


[↑ Sommaire](#)

[↓ Index](#)

Passériformes
Paridés

Nom local : Sinzilio (Sinzilia) jaune.

GB : Great Tit - D : Kohlmeise - NL : Koolmees - I : Cinciallegra - E : Carbonero común - DK : Musvit - S : Talgloxe.



Taille : 14 cm.

Description : Tête noire sauf joues blanches, Dessous jaune vif partagé par une raie longitudinale noire, plus large chez le mâle. Dessus vert olive. Ailes et queue teintées de gris-bleu.

Sédentaire : Certains hivers, apport d'oiseaux d'Europe centrale.

Habitat : Bois de feuillus, bocages, vergers, parcs et jardins.

Nourriture : Insectes (larves, chenilles...), araignées, baies, fruits ; graines riches en huile en hiver (faines). Visiteuse assidue des mangeoires.

Particularités : Elle dort à l'abri dans une cavité d'arbre ou de mur ou dans un nichoir. Son répertoire musical est très varié, son chant aigu et clair. Son interprétation du célèbre "Ti-ti ping" est à ne manquer sous aucun prétexte.

A La Roche : Commune partout et en toute saison. Evolue l'hiver en compagnie des autres Mésanges.


46 **Sittelle torchepot** - *Sitta europaea*
Protégée

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Sittidés

Nom local : Grimperau, Grimperou.

GB : Nuthatch - D : Kleiber - NL : Boomklever - I : Picchio muratore - E : Trepador azul. - DK : Spætmejsje - S : Nötväcka.



Taille. : 14 cm.

Description : **Long bec pointu**. Pattes et queue courtes, **Dos gris-bleu**. Long trait noir au travers de l'œil. Gorge et joues blanches. **Dessous roussâtre**. Flancs marron. Race Scandinave : dessous blanc.

Sédentaire

Habitat : Bois de feuillus, parcs, jardins, vergers avec vieux arbres.

Nourriture : Insectes et araignées vivant sur les arbres semences d'arbres. Fréquente les mangeoires en hiver.

Particularités : **Seul oiseau à descendre les troncs la tête en bas** : cela suffit à l'identifier. Ouvre, à coups de bec, les noisettes et autres coquilles dures après les avoir coincées dans l'écorce.


A La Roche : Elle fait partie des habitués de Lavergne où elle a sa table réservée dans deux vieux châtaigniers.

47 **Grimpereau des jardins** - *Certhia brachydactylus* [↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)
Protégé

Passériformes
Certhiids

Nom local : Grimperau, Grimperou.

GB : Short-toed Treecreeper - D : Gartenbaumläufer, Hausbaumläufer - NL : Boomkruiper - I : Rampichino
E : Agateador común. - DK : Kortttæt Træløber - S : Kortkload Trädkrypare.



Taille : 12 cm.

Description : Dessus brun tacheté de gris et nuancé de roux au croupion. Gorge et poitrine blanches. Ventre grisâtre. Flancs et bas-ventre roussâtres. Long bec fin et arqué. Sourcil clair peu «arqué». (Peut être confondu avec le Grimpereau des bois que je n'ai pas observé à La Roche : on le distingue par le chant ou par la longueur du « pouce »... une subtilité réservée aux niveaux avancés

Sédentaire

Habitat : Bois clairs de feuillus, parfois aussi de conifères : parcs et jardins avec de vieux arbres.

Nourriture : Insectes, araignées, cloportes que le Grimpereau extrait des fissures des écorces grâce à son long bec fin. Mange aussi quelques graines.

Particularités : Grimpe en spirale autour des troncs jusqu'au sommet puis vole vers le pied de l'arbre suivant... et recommence. S'appuie sur la queue comme un Pic.

A La Roche : Identifié avec certitude à Lavergne, mais sans doute observé à plusieurs reprises près du Bourg.

48 **Pie-grièche écorcheur** - *Lanius collurio*
Protégée


[↑ Sommaire](#)

[↓ Index](#)

Passériformes
Laniidés

Nom local : Racajassa.

GB : Red-backed Shrike - D : Neuntöter, Rotrückenwürger - NL : Grauwe klauwier - I : Averla piccola
E : Alcaudón dorsirrojo - DK : Rødrygget Tornskade - S : Törnskata.



Taille : 17 cm.

Description : **Mâle : dos roux**. calotte et croupion gris, **large bandeau noir** à travers l'œil, **queue noire bordée de blanc, dessous rose pâle**. Femelle : dessus brun roux, dessous roussâtre marqué de taches brunes en forme de croissants, souvent sans bandeau noir, queue brune.

Migrateur : Présent de mi-avril à septembre. Migre vers l'Afrique tropicale et du Sud.

Habitat : Espaces découverts pourvus de buissons épais, de broussailles et de taillis ainsi que de postes d'aguets bien dégagés.

Nourriture : Insectes, petits vertébrés.

Particularités : Son nom témoigne de la mauvaise réputation qu'elle s'est taillée à cause de son habitude discutable d'empaler ses proies sur des épines (aubépine, prunellier, barbelés), constituant ainsi de véritables garde-manger appelés "lardoirs".

A La Roche : A La Roche Hausnière.

49 Geai des chênes - *Garrulus glandarius*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Corvidés

Nom local : Gei, Pierre.

GB : Jay - D : Eichelhäher - NL : Vlaamse gaai - I : Ghiandaia - E : Arrendajo - DK : Skovskade - S : Nötskrika.

Taille : 33 ».

Description : Corps brun rosé, Queue noire et croupion blanc très visibles en vol. Grandes ailes arrondies, marquées d'une tache blanche et d'une autre bleue rayée de noir. Huppe rayée noir et blanc. Moustaches noires.


Sédentaire

Habitat : Bois de feuillus (surtout de chênes) et mixtes.

Nourriture : Glands, fânes, châtaignes, fruits et baies (3/4 de sa diète) ; insectes, mollusques, quelques œufs et oisillons en période d'élevage des jeunes.

Particularités : Très jolies couleurs. Oiseau des bois par excellence, il se tient le plus souvent à couvert. Il constitue des réserves de glands dont il consomme une partie : les "oubliés" germent et c'est ainsi que le Geai aide à la dissémination du chêne. Sentinelle attentive, il sonne l'alarme dès qu'un importun approche (un ornithologue amateur, par exemple), faisant fuir toute la gent ailée.

A La Roche : Abondant dans tous les bois en toute saison.



50 **Pie bavarde** - *Pica pica*
Corvidés

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes

Nom local : Jassa, Ajass, Sassa, Agassa.

GB : Magpie - D : Elster - NL : Ekster - I : Gazza - E : Urraca, Aburraca - DK : Husskade - S : Skata.

Taille : 50 cm.

Description : **Noire et blanche**. Scapulaires (épaules), flancs et ventre blancs. Le reste noir avec des reflets verts, bleus et violets. **Très longue queue** aux reflets verts.


Sédentaire

Habitat : Régions cultivées et dégagées, avec petits bois, haies, bosquets ; parcs et jardins.

Nourriture : Gros insectes et larves : araignées, mollusques, petits vertébrés, œufs : graines et fruits.

Particularités : Chacun connaît son goût pour les objets brillants (Les bijoux de la Castafiore, ou plus classiquement, l'opéra La Pie Voleuse) qui lui rappellent sans doute les scarabées et autres coléoptères aux couleurs métallisées dont elle se délecte. Les Pies se regroupent le soir en "dortoirs", Si elles "jacassent" beaucoup et se montrent souvent hardies, elles restent tout de même très méfiantes à l'égard de l'Homme. En Angleterre, on leur envoie des baisers quand on les voit, un à chacune : cela porte bonheur.

A La Roche : A Lavergne, au Bourg...



Nom local : Graula.

G8 : Carrion Crow - D : Raberkrähe - NL : Zwarte kraai - I : Cornacchia nera - E : Corneja negra - DK : Krage - S : Svart Kråka.

Taille : 46 cm.

Description : Grand oiseau. **Entièrement noire** avec des reflets violacés lorsqu'elle se trouve en pleine lumière.


Sédentaire

Habitat : Régions cultivées avec arbres et bosquets ; marais, abords de rivières, côtes ; parcs et jardins.

Nourriture : Grains, céréales, fruits : mollusques, insectes, poissons, oisillons, œufs. Il n'est pas établi scientifiquement si elle est plus « nuisible » par sa consommation de céréales qu'« utile » grâce à la destruction d'insectes qu'elle effectue.


Particularités : On l'appelle souvent "Corbeau" à tort : il n'y a pas de Corbeaux freux à La Roche, ni de Grands corbeaux, devenus rares partout. Les Corneilles s'en prennent souvent aux Buses. Comportement social intéressant.

A La Roche : On peut en voir dans tous les prés et champs. Au crépuscule, elles s'envolent de Lavergne par petits groupes, en direction du Sud-Ouest, vers leur dortoir. On en réveille toujours quelques unes si on se promène la nuit sur le Chemin de Lavergne.



Nom local : Estournel.

GB : Starling - D : Star - NL : Spreeuw - I : Storno - E : Estornino - DK : Står - S : Stare.



Taille : 20 cm.

Description : Plumage sombre aux reflets irisés verts et violets. Queue courte. Ailes pointues et triangulaires, Bec solide, long et pointu. Livrée hivernale ornée de nombreuses taches blanches.

Migrateur partiel : Apport de très nombreux oiseaux de l'Europe de l'Est en hiver.

Habitat : Campagne cultivée : bocage, lisières des bois, villages et villes.

Nourriture : Très variée : insectes et larves, araignées, mollusques ; fruits, graines. En Europe de l'Est, on apprécie le régime insectivore des Etourneaux au point de leur offrir des nichoirs pour les inviter à se multiplier. A l'Ouest, par contre, après l'arrivée des hivernants venus de l'Est, des nuées d'Etourneaux s'en prennent aux silos à maïs et aux céréales en germination, causant d'importants dégâts dans certaines régions.

Particularités : Forment des "dortoirs" bruyants de plusieurs milliers d'individus dans les roseaux, les bois ou les villes. Pris individuellement, c'est un visiteur très divertissant : il imite tout, des chants et gazouillis d'autres oiseaux aux pétarades des mobylettes.

A La Roche : Petits effectifs, notamment à Lavergne. Pas de dortoir connu.


53 **Moineau domestique** - *Passer domesticus*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Passéridés

Nom local : Piulou, Piuleu.

GB : House Sparrow - D : Haussperling - NL : Huismus - I : Passera europea - E : Gorrión común - DK : Gråspurv - S : Gråsparv.



Taille : 14,5 cm.

Description : **Mâle** : calotte grise, nuque rousse, bavette noire, joues et dessous gris pâle, dessus brun-roux rayé de noir. **Femelle** : dessus brun gris rayé de noir, dessous plus pâle et uni. Les deux ont le bec puissant et court des granivores.

Sédentaire

Habitat : Zones habitées : ternes, villages et villes.

Nourriture : Graines, bourgeons, fruits : insectes : déchets divers.

Particularités : C'est certainement l'oiseau le plus audacieux et le mieux connu des citadins, le « piaf » qui vient picorer dans la main. Sobre, opportuniste et doté d'un formidable culot, il est commun presque partout où l'Homme habite.

A La Roche : Commun au Bourg, aux Quatre-Routes, présent à Lavergne en petit nombre. Rare autour des maisons isolées : je n'en ai encore jamais vu dans mon jardin... où ne manquent pourtant pas les oiseaux rares !

55 **Pinson des arbres** - *Fringilla coelebs*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Fringillidés

Nom local : Pinçon.

GB : Chaffinch - D : Buchfink - NL : Vink - I : Fringuello - E : Pinzón común - DK : Bogfinke - S : Bofink.

Taille : 15 cm.

Description : **Mâle (été) : dessous rose vineux, calotte et nuque gris ardoise**, dos roux, croupion verdâtre. Plus terne en hiver. Femelle : brun olive, dessous plus pâle. Les deux : **doublie barre alaire blanche et rectrices externes blanches**, deux caractères très visibles en vol.


Migrateur partiel : Présent toute l'année. Apport, dans le Limousin, d'oiseaux du Nord et de l'Est de l'Europe en hiver. Migre jusqu'en Afrique. Nombreux sédentaires.

Habitat : Milieux boisés clairs (hêtraies), lisières ; parcs, jardins, vergers.

Nourriture : Graines, surtout oléagineuses (fânes des hêtres), baies, insectes au printemps.

Particularités : Auteur-compositeur-interprète d'une petite ritournelle célèbre qui résonne à longueur de journée dans tous les bois à la mode : "Ti-ti-ti-ti-ti-ti siruitiôu". En Belgique, élevé en captivité pour des concours de chant. Les sexes vivent séparés en hiver (coelebs = célibataire). Les Pinsons se mêlent alors aux Verdiers et aux Bruants.

A La Roche : Présent sur tout le territoire, y compris le Bourg, Très abondant, sauf au milieu des bois.



56 **Pinson du Nord** - *Fringilla montifringilla*
Protégé

Passériformes
Fringillidés

Nom local : Pinçon (Voir : Pinson des arbres, l'occitan ne fait pas la distinction).
GB : Brambling - D : Bergfink - NL : Keep - I : Peppola - E : Pinzón real - DK : Kværkerfinke - S : Bergfink.

Taille : 14,5 à 16 cm.

Description : En hiver (période à laquelle il est présent en Limousin) : **croupion blanc** très visible en vol, tache orange à l'épaule, **poitrine orange**, ventre blanc, tête et dos brun rayé, barres alaires blanches. Femelle plus terne, «oins orange, (En été, le Mâle a la tête et le dos noirs).


Migrateur et hivernant : Présent l'hiver en Limousin.

Habitat : Champs, surtout de maïs, bois de hêtres, parcs, jardins.

Nourriture : Fânes des hêtres, semences de céréales ; graines de maïs et de sorgho, baies ; insectes en été.

Particularités : Niche dans les pays du Nord de l'Europe. Son abondance était liée autrefois à celle des fânes, principale ressource alimentaire en hiver. Aujourd'hui le développement des cultures de maïs et de sorgho offre aux Pinsons du Nord hivernant chez nous une source stable de nourriture. En hiver, des dortoirs peuvent regrouper plusieurs millions d'oiseaux.

A La Roche : Je soupçonne leur présence dans tous les champs de maïs qu'ils doivent explorer les uns après les autres. Je les ai observés dans le grand champ derrière le garage Puyfagès.



56 **Serin cini** - *Serinus serinus*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Fringillidés

GB : Serin - D : Girlitz - NL : Europese kanarie - I : Vercellino - E : Serín - DK : Gulirisk - S : Gulhämpling.

Taille : 11 cm.


Description : **Très petit**. Bec très court et épais.
Croupion jaune vif. Mâle : front, sourcil, gorge et poitrine jaunes, dessus brun rayé. Femelle beaucoup moins jaune et davantage rayée.

Migrateur partiel : Petit nombre de sédentaires lors des hivers doux. Migre vers les régions méditerranéennes.

Habitat : Lieux habités semi-boisés ; lisières des bois, parcs, jardins, vergers.

Nourriture : Graines d'herbes sauvages ou de plantes potagères.

Particularités : Proche parent du Canari des volières, il s'évertue à égayer nos jardins de son gazouillis allègre... et personne ne le remarque, malgré son joli plastron couleur bouton d'or, tant il est petit. Originaire du Midi, l'espèce semble progresser peu à peu vers le Nord.



A La Roche : Régulier dans plusieurs jardins du Bourg et à Lavergne.

57 **Verdier d'Europe** - *Chloris chloris*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Fringillidés

Nom local : Verdouja, Verdau

GB : Greenfinch - D : Grünfink - NL : Groenling - I : Verdone - E : Verderón común - DK : Grønirisk - S : Grönfink.



Taille : 14, 5 cm.

Description : Vert olive. Croupion vert jaune. Bandes jaune vif à l'aile et au bord de la queue. Bec épais. Femelle plus terne, moins jaune.

Migrateur partiel : Présent toute l'année. Apport d'oiseaux du Nord et de l'Est de l'Europe en hiver.

Habitat : Régions cultivées ; jardins et parcs avec arbres ; bois de conifères.

Nourriture : Graines d'herbes sauvages et de céréales, semences d'arbres ; marc de pomme ou de raisin ; insectes en faible quantité.

Particularités : Le bien nommé : l'Europe entière est unanime... un exploit ! C'est un hôte assidu, voire envahissant des mangeoires : sa taille intimide les Mésanges. Il est sociable et évolue souvent en bandes.

A La Roche : Au Bourg.'est un oiseau commun en Limousin, facile à identifier... mais je ne le vois pas souvent Je m'en vais de ce pas faire vérifier mes lunettes.

58 **Chardonneret élégant** - *Carduelis carduelis* [↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)
Protégé

Passériformes
Fringillidés

Nom local : Cardi, Cardinot.

GB : Goldfinch - D : Stieglitz, Distelfink - NL : Putter - I : Cardellino - E : Jilguero - DK : Stillits - S : Steglits.



Taille : 12 c».

Description : Tête rouge (face), blanche et noire. Dos brun-roux. Ailes noires avec une large bande jaune vif très visible en vol. Queue noire et blanche. Croupion blanchâtre. Bec long et pointu.

Migrateur partiel : Présent toute l'année. Apport d'oiseaux du Nord et de l'Est de l'Europe en hiver.

Habitat : Lieux cultivés ; lisières des bois ; parcs, jardins, vergers, friches.

Nourriture : Graines, en particulier de chardons, cardères, bardanes, centaurees ; quelques insectes au printemps.

Particularités : Plutôt discrets en période de reproduction, les Chardonnerets, très sociables, se rassemblent en groupes à la fin de l'été. Leur joli costume et leur chant, agréable babil orné de roulades et de trilles, leur coûtent souvent la liberté.

A La Roche : Commun à Lavergne, au Bourg, aux Quatre-Routes.


59 **Bouvreuil pivoine** - *Pyrrhula pyrrhula*
Protégé

[↑ Sommaire](#) [↓ Index](#)

Passériformes
Fringillidés

Nom local : Pamparor.

GB : Bullfinch - D : Gimpel - NL : Goudvink - I : Ciuffolotto - E : Camachuelo común - DK : Dompap - S : Domherre.



Taille : 14,5 à 16 cm.

Description : **Aspect lourd**. **Mâle : dessous rose vif ou rouge**, dessus gris bleu. Femelle : dessous gris rosé, dessus gris brun. Les deux : calotte et menton noirs, bec noir épais et court, **croupion blanc** très visible en vol, queue noire, ailes noires avec tache alaire blanche.

Migrateur partiel : Nombreux sédentaires. Apport d'oiseaux d'Europe centrale en hiver.

Habitat : Milieux boisés avec végétation dense ; bois d'épicéas ; parcs et jardins.

Nourriture : Presque exclusivement végétale ; semences d'arbres, graines de baies diverses et (hélas !) bourgeons d'arbres fruitiers.

Particularités : En criminel méthodique, il prend soin de nettoyer son bec en le frottant sur un rameau après avoir commis ses larcins sur vos arbres fruitiers. Oiseau discret, au cri doux et mélancolique : "diu, diu".

A La Roche : Présent mais peu abondant, à Lavergne, au Bourg, au Moulin de Larchat.

60 **Bruant jaune** - *Emberiza citrinella*

[↑ Sommaire](#)

[↓ Index](#)

Passériformes


Protégé

Emberizidés

GB : Yellowhammer - D : Goldammer - NL : Geelgors - I : Zigolo giallo - E : Escribano cerillo - DK : Gulspurv - S : Gulsparv.

Taille : 16,5 cm.

Description : **Mâle : tête et dessous jaune citron, dos roux rayé**, bandes sombres sur la tête. Femelle : beaucoup moins jaune, plus rayée. Les deux : **croupion roux** qui le distingue du [Bruant zizi](#) et longue queue aux **rectrices externes blanches**, deux caractères très visibles en vol.



Migrateur partiel.

Habitat : Régions dégagées avec arbres, haies et buissons : coupes forestières où il reste des arbres : lisières, friches boisées.

Nourriture : Surtout des graines de plantes sauvages et de céréales glanées à terre : insectes, araignées mollusques au printemps.


Particularités : Vraiment bien nommé : l'intensité du jaune dans le plumage du mâle est saisissante, Son chant ne sera jamais un tube mais il est amusant : "tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi tsih". En Anglais : "a-little-bit-of-bread-and-no-cheese". Le Français ("un-petit-peu-de-pain-et-pas-de-fromage") est sans intérêt ornithologico-musical.

A La Roche : Régulier le long du ruisseau des Vergnes, à l'Ouest du Pont Madame, Observé derrière le garage Puyfagès en bonne compagnie : Pinsons des arbres et du Nord.

Nom local : Pijou.

Le Pigeon biset est l'ancêtre du Pigeon domestique, le Pigeon bigarré de nos villes et villages.

GB : Pigeon (Rock dove) - D : (Felsen)taube - NL : (Rots)duif- I : Piccione (selvatico)- E : Paloma (bravia) - DK : Tamdue (Klippedue) - S : (Klipp)duva.



Taille : 32 cm.

Description : La diversité des plumages est infinie, combinaison de blanc, noir, gris, roux. Mais beaucoup ont gardé la belle livrée du Pigeon biset : corps gris, avec du vert et du rose brillant au cou, **double barre alaire noires et croupion blanc**.

Sédentaire.

Habitat : Villes et villages. Biset : falaises et rochers.

Nourriture : Comme les autres pigeons : déchets.

Particularités : On peut déplorer les dégradations que les déjections du P. domestique causent aux édifices de nos villes, Cependant leur familiarité fait la joie de tous les enfants du monde.

A La Roche : Surtout au Bourg et, bien sûr, dans et autour de toutes les fermes où on les élève.

Nom local : AUSA (oïe : l'occitan ne fait pas la distinction pour ces Migrateurs).

GB : Crane - D : Kranich - NL : Kraanvogel - I : Gru - E : Grulla común - DK : Trane - S : Trana.

Taille : 112 cm. E : 220-245 cm.

Description : Très grand oiseau gris au long cou, aux longues pattes et à la queue noire en panache, comme celle d'un coq. Tête et cou noirs avec, de chaque côté, une large bande blanche allant de l'oeil jusqu'à la base du cou. Tache rouge sur le haut du crâne.


Migrateur : Visible chez nous seulement en migration en février-mars et en octobre-novembre. Niche au Nord de l'Europe, hiverne au Sud et en Afrique.

Habitat : Zônes Marécageuses, abords des étangs et des lacs.

Nourriture : Céréales, verdure ; insectes, mollusques, parfois petits vertébrés.

Particularités : La parade nuptiale des Grues est une véritable danse dont la grâce inspire les peintres et les poètes orientaux depuis toujours. Plus prosaïquement, la Grue vole avec le cou et les pattes tendues, ce qui la distingue du Héron qui vole le cou plié. Les Grues crient sans cesse en vol, "grou-grou-grou", et volent aussi la nuit (contrairement aux oies sauvages).

A La Roche : Les Grues survolent La Roche Canillac en Migration, Nous avons noté leur passage au-dessus de Lavergne, de jour comme de nuit.



[↑ Sommaire](#)

[↓ Index](#)

A **Bruant zizi**- *Emberiza cirluss*

Protégé

Passériformes

Embérizidés

GB : Cirl Bunting - D : Zaunammer - NL : Cirlgors - I : Zigolo nero - E : Escribano soteño - DK : Gærdeværbling - S : Häcksparv.

Taille : 15 à 16,5cm.


Description : Mâle : Dessous jaune, poitrine olivâtre, gorge noire, flancs striés, épaules brun-roux. Femelle : ressemble à la femelle du [Bruant jaune](#) en plus terne. Les deux se distinguent du Bruant jaune par un jaune plus terne, le croupion gris-olivâtre et la queue plus courte.

Sédentaire

Habitat : Campagne cultivée et boisée, lisières, jardins. Haies, broussailles. Nid dans les buissons

Nourriture : Comme Bruant jaune. Surtout des graines de plantes sauvages et de céréales glanées à terre : insectes, araignées mollusques au printemps.

Particularités : Cri d'appel : long « zih ». Cri de contact : « zitt » fin et bref. Chant : trille rapide et roulé, un peu métallique.



A La Roche : Observé une fois, en février, sur la petite route qui longe le cimetière.

INDEX DES NOMS FRANÇAIS ↑

PAR NUMERO		ALPHABETIQUE	
A Bruant zizi	32	22 Accenteur mouchet	44 Mésange bleue
1 Héron cendré	33	19 Bergeronnette des ruisseaux	45 Mésange charbonnière
2 Canard colvert	34	20 Bergeronnette grise	42 Mésange huppée
3 Milan noir	35	59 Bouvreuil pivoine	43 Mésange noire
4 Milan royal	36	60 Bruant jaune	41 Mésange nonnette
5 Buse variable	37	A Bruant zizi	3 Milan noir
6 Pigeon ramier	38	5 Buse variable	4 Milan royal
7 Tourterelle turque	39	2 Canard colvert	53 Moineau domestique
8 Tourterelle des bois	40	58 Chardonneret élégant	15 Pic épeiche
9 Cocou gris	41	11 Chouette chevêche	16 Pic épeichette
10 Chouette effraie	42	10 Chouette effraie	14 Pic vert
11 Chouette chevêche	43	12 Chouette hulotte	50 Pie bavarde
12 Chouette hulotte	44	51 Corneille noire	48 Pie-grièche écorcheur
13 Martinet noir	45	9 Cocou gris	61 Pigeon biset/domestique
14 Pic vert	46	52 Etourneau sansonnet	6 Pigeon ramier
15 Pic épeiche	47	33 Fauvette à tête noire	54 Pinson des arbres
16 Pic épeichette	48	32 Fauvette des jardins	55 Pinson du Nord
17 Hirondelle rustique	49	31 Fauvette grisette	34 Pouillot siffleur
18 Hirondelle de fenêtre	50	49 Geai des chênes	35 Pouillot véloce
19 Bergeronnette des ruisseaux	51	39 Gobemouche noir	36 Roitelet huppé
20 Bergeronnette grise	52	38 Gobemouche gris	37 Roitelet triple-bandeau
21 Troglodyte mignon	53	47 Grimpereau des jardins	23 Rouge-gorge familier
22 Accenteur mouchet	54	29 Grive draine	25 Rougequeue à front blanc
23 Rouge-gorge familier	55	28 Grive musicienne	24 Rougequeue noir
24 Rougequeue noir	56	62 Grue cendrée	56 Serin cini
25 Rougequeue à front blanc	57	1 Héron cendré	46 Sittelle torchepot
26 Traquet pâte	58	18 Hirondelle de fenêtre	8 Tourterelle des bois
27 Merle noir	59	17 Hirondelle rustique	7 Tourterelle turque
28 Grive musicienne	60	30 Hypolaïs polyglotte	26 Traquet pâte
29 Grive draine	61	13 Martinet noir	21 Troglodyte mignon
30 Hypolaïs polyglotte	62	27 Merle noir	57 Verdier d'Europe
31 Fauvette grisette		40 Mésange à longue queue	

PROMENADES ORNITHOLOGIQUES ↑

Les pages suivantes vous proposent quatre parcours faciles et agréables à travers La Roche Canillac, Outre leur intérêt touristique et un effet incontestablement bénéfique sur votre santé, ils vous offrent un menu ornithologique varié et copieux.


Sur chaque carte, le circuit est indiqué par des flèches ("C'est original !"). A chaque espèce décrite dans ce livre un numéro a été attribué suivant son ordre d'apparition (Ex : 1 Héron cendré, 2 Canard colvert). En page 70, vous trouverez dans l'[index](#) une liste alphabétique des espèces avec leurs "numéros de code" ("Tiens ! Les

oiseaux portent des dossards à La Roche ?"). Ce classement correspond à une classification systématique (il en existe plusieurs) utilisée dans de nombreuses publications spécialisées.


Voilà donc le secret des numéros mystérieux sur les cartes : derrière chacun d'eux se cache un oiseau, à l'endroit précis où je l'ai vu ou entendu régulièrement et où vous avez de grandes chances de le rencontrer vous-même. Exemple : 5, à Beaufort indique une Buse dans le poulailler de... Non, non ! C'est une erreur ! Deuxième exemple : 7 sur l'église, une Tourterelle turque sur le clocher - un endroit où l'on peut être à peu près certain d'en voir*.



* L'auteur décline toute responsabilité en cas d'absence de l'oiseau.



72



PROMENADE DE LA ROCHE BASSE

